



เทศบาลตำบลท่านา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (HOME ISOLATION: HI)

ขยะที่ติดเชื้อ ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

กรณีในพื้นที่ชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ
เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติ



1. ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้มัดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวลงในถุงดำ เมื่อทำลายเชื้อ



2. มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง



3. ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง



4. ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่ง อบต. ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป



5. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที